

Test de Graham (Test de los celos; Estudio Oxiuros)


Necesita:

3 cristales (portas), celo adhesivo transparente (NO MATE) y un recipiente (bote de plástico estéril o placa de petri)

Las muestras se recogen en **DÍAS ALTERNOS**

Se recoge a **PRIMERA HORA DE LA MAÑANA** antes de orinar, defecar o bañarse (SIN LAVARSE y SIN CREMAS).

1. Separe los glúteos y PEGUE la cinta adhesiva (4-5 cm) sobre el ORIFICIO ANAL
2. Sin apenas tocarla PEGUE el celo **SÓLO SOBRE UNA DE LAS DOS CARAS DE UN PORTA** (SIN ARRUGAS y en el mismo sentido del porta)
3. Guarde el cristal con el celo pegado en el recipiente
4. Lávese bien las manos con agua y jabón
5. Repita la operación en las 2 mañanas alternas, enviando así para el estudio **3 portas con celo en el envase**



Test de Graham para investigación de *Enterobius vermicularis*
(oxiuros)

Afecta fundamentalmente a **NIÑOS**
(prurito anal o vaginal de predominio nocturno
o gusanos adultos en las heces (móviles))



La infección se adquiere por ingestión de huevos, la transmisión es persona a persona y es muy frecuente la autoinfestación mano-boca

SÓLO ESTÁ INDICADO EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y
SUS CONTACTOS FAMILIARES Y/O ESCOLARES

EN EL VOLANTE en el caso de JÓVENES, ADULTOS O ANCIANOS es
IMPRESINDIBLE JUSTIFICAR el **CONTACTO CON PERSONAS**
INFESTADAS de no ser así esta prueba NO SE REALIZARÁ

Ante un paciente con clínica sospechosa, lo ideal es obtener 3 muestras del margen anal de días alternos.